

Accu-Chek 3-Dagarsprofil



| | | Dag 1 | | | | | Dag 2 | | | | | Dag 3 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| | | Datum | | | | | Datum | | | | | Datum | | | | | | | | | | |
| | | Innan frukost | 2 timmar efter frukost | Före lunch | 2 timmar efter lunch | Före middag | 2 timmar efter middag | Innan sänggående | Innan frukost | 2 timmar efter frukost | Före lunch | 2 timmar efter lunch | Före middag | 2 timmar efter middag | Innan sänggående | Innan frukost | 2 timmar efter frukost | Före lunch | 2 timmar efter lunch | Före middag | 2 timmar efter middag | Innan sänggående |
| Tid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodsocker mmol/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLODsockERINTERVALL (MMOL/L) | HÖGT | >16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14,0-16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12,0-14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10,0-12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8,0-10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,0-8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,0-6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LÅGT | 2,0-4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |